



¿Te has puesto a pensar de dónde viene tu pescado?



Cachema (*Isopisthus remifer*)

Descripción general

La cachema, corvina plateada o corvina ojona, es una de las especies más consumidas en el Ecuador. Pertenece a la familia Sciaenidae, que tiene una particularidad: producen un sonido al nadar parecido al croar de una rana. La cachema es un pez pequeño que mide en promedio alrededor de 36 cm. Tiene dos aletas dorsales (en la espalda) puntiagudas y dos pequeñas en la panza.

Distribución geográfica

La cachema se encuentra desde California hasta Perú, así como en las costas de Brasil. En Ecuador, se encuentra desde Esmeraldas hasta el Golfo de Guayaquil.

Hábitat

A lo largo de la costa, tanto en el mar, como en bocas de río y manglares. Es bentopelágica, es decir, que ocurre tanto en el fondo del mar como en la columna de agua— se encuentra entre 4 y 50 m de profundidad.

Nivel trófico

La cachema es un depredador y se alimenta principalmente de otros peces, camarones, cangrejos y calamares.

Hábitos reproductivos

La cachema alcanza la madurez sexual alrededor de los 25 cm. Utiliza las aguas abiertas para alimentarse y crecer, y, las costas y estuarios para reproducirse.

Métodos de captura

En Ecuador, la cachema se captura [artesanalmente](#) con trasmallo de mono- y multifilamento, e [industrialmente](#) con [redes cerqueras](#). Además, la cachema se captura incidentalmente con [red de arrastre](#) camaronera.

Pesca incidental asociada a sus capturas

Las redes de [trasmallo](#) están asociadas a enredamientos de mamíferos marinos, tortugas y tiburones. En el Ecuador, las redes de enmalle ponen en peligro a varias

especies de delfines, a ballenas jorobadas, cachalotes y otros cetáceos que pueden enredarse, y en algunos casos, ahogarse. Las redes de enmalle de fondo también están asociadas a la pesca [incidental](#) de tiburones y otras especies de peces no comerciales.

Estado de población y amenazas

Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el estado global de conservación de la cachema es de [menor preocupación](#) porque sus poblaciones no se han reducido en los últimos años. Habiendo dicho esto, en la provincia del Guayas, entre el 2004 y 2014, la captura de esta especie se ha reducido en un 30%, a la vez que las capturas tuvieron tamaños y pesos promedios más bajos. Además, los juveniles parecen especialmente vulnerables a la captura incidental con [redes de arrastre](#) camaroneras.

Click [aquí](#) para la Bibliografía.

¿Cómo citar?

En el texto:

(De la red Al plato, 2023)

En la bibliografía:

De la red Al plato. 2023. Cachema (*Isopisthus remifer*). Fecha de consulta: dd/mm/aaaa.

Url: www.delaredalplato.com.